

DACTYLE TARDIF
Durée d'exploitation: 5 ans et plus



FOURRAGÈRES LG
CULTIVER LA QUALITÉ



CAPTUR BIO

La performance et l'endurance associées

GAMME
LG BIO



Utilisation



- Excellent rendement
- Vigueur sortie hiver
- Etat sanitaire exceptionnel
- Souplesse d'exploitation



Retrouvez plus d'informations
sur LGseeds.fr



DACTYLE TARDIF
Durée d'exploitation : 5 ans et plus

CAPTUR BIO

La performance et l'endurance associées



Inscription : 2016
Cotation : 110,9 %
(Témoins : Ludovic, Cristobal, Beluga)
Départ en végétation : 27/03
Début épiaison : 10/05

Utilisation



PÂTURAGE



AFFOURAGEMENT



ENSILAGE



ENRUBANNAGE



FOIN

● Peu adapté ● Moyennement adapté ● Très adapté

Conseils culturaux

■ Semis :

- Intervenir sur un sol réchauffé pour favoriser la germination.
- Semis à 1 cm de profondeur.
- Pour limiter l'effet ligne et assurer une bonne couverture du sol, il est conseillé d'utiliser un semoir à céréales avec les éléments semeurs relevés en veillant à recouvrir légèrement les semences avec la herse de recouvrement.
- Dose en pur : de 20 à 25 kg/ha.
- Dose en association : CAPTUR BIO 20 à 25 kg/ha + 2 à 3 kg de trèfle blanc.
- Rouler impérativement derrière le semis pour favoriser un bon contact terre/semences.
- Surveiller la présence éventuelle de limaces à la levée et intervenir si nécessaire en respectant les précautions d'usage.

■ Exploitation :


- Dès que la portance le permet, un déprimage par les animaux favorise le tallage et offre ensuite un fourrage de meilleure qualité et un rendement supérieur.
- Nettoyer la parcelle avant l'hiver pour favoriser le redémarrage au printemps suivant.

■ Caractères agronomiques :

- Souplesse d'exploitation : 46 jours (source Herbe book)
- Tolérance à la rouille : 7,6/9 (source Herbe book)
- Vigueur sortie hiver : 6,5/9 (149 % des témoins CTPS)

Performances de la variété

Cotation de la variété par rapport aux témoins CTPS



Pour une **ration plus efficace**, la **technologie innovante** et **simple d'utilisation** du LG LAB, utilisez le proche infrarouge pour acquérir une **connaissance précise des valeurs alimentaires des fourrages**.



Les points forts

- Excellent rendement et en particulier sur la coupe 1 (1^{ère} variété tardive).
- Vigueur sortie hiver très dynamique pour exploiter la prairie rapidement en sortie hiver.
- Bonne souplesse d'exploitation permettant une gestion plus facile au premier cycle de pâturage.
- Etat sanitaire exceptionnel.

Nos conseils

- Choisir des parcelles non hydromorphes et portantes pour exploiter tôt au printemps.
- Au pâturage, faire des cycles courts pour préserver l'appétence (3 semaines maximum entre deux pâturages).
- Faucher à une hauteur de 6 à 8 cm.
- Exploiter la parcelle avant l'hiver pour faciliter le redémarrage en végétation au printemps.

Les renseignements fournis dans ce document ne sont donnés qu'à titre indicatif et peuvent varier en fonction des conditions agronomiques et climatiques, ainsi que des techniques culturales. La résistance aux maladies concerne les maladies ou souches actuellement connues en France.