

COMPOSITION PRAIRIALE
Durée d'exploitation: 6 mois



FOURRAGÈRES LG
CULTIVER LA QUALITÉ



LG RAPIDOR SEIGLE

Du fourrage rapide idéal en méthanisation



Utilisation



- Très haute productivité
- Installation très rapide
- Récolte précoce avant fin avril
- Système racinaire structurant le sol



Retrouvez plus d'informations
sur LGseeds.fr





LG RAPIDOR SEIGLE

Du fourrage rapide idéal en méthanisation

Utilisation

- PÂTURAGE
- AFFOURAGEMENT**
- ENSILAGE
- ENRUBANNAGE
- FOIN

- Peu adapté
- Moyennement adapté
- Très adapté**



Un assemblage de deux variétés de seigles pour une récolte précoce de haut niveau.


- Une variété de seigle fourrager spécifiquement sélectionnée sur son haut niveau de rendement et sa précocité
- Une variété de seigle céréalière qui offre un bon tallage et une excellente tolérance à la verse.

La complémentarité des deux variétés permet de récolter dans de bonnes conditions et sans verse puisque la variété céréalière assure le maintien de la variété fourragère qui est plus avancée à la date optimale de récolte. Par la même occasion, la qualité est préservée.

Composition

Espèce	Variété	Type variétal	Points forts
Seigle	HUMBOLT	Fourrager	Variété très feuillue, productive, pousse précoce en sortie d'hiver
Seigle	MATADOR	Céréalière	Bon rendement, tallage important, bonne tolérance à la verse

Composition du mélange



- Seigle HUMBOLT
- Seigle MATADOR

Valeurs alimentaires

Résultats d'essais avec RGI en base 100

Mesure fin avril	Rendement MS en kg/ha	Rendement relatif base RGI	Rendement UFL / ha	Rendement relatif base RGI
LG RAPIDOR SEIGLE	6 700	261	4 732	163
RGI base 100	3 100	100	2 900	100

RGI : ray-grass italien - MS : matière sèche - UFL : unité fourragère lait



Pour une **ration plus efficace**, la **technologie innovante** et **simple d'utilisation** du LG LAB, utilise le proche infrarouge pour acquérir une **connaissance précise** des **valeurs alimentaires des fourrages**.



Les points forts

- Potentiel de rendement exceptionnel.
- Solution idéale en méthanisation pour avoir du fourrage rapidement.
- Récolte très précoce avant fin avril.
- Idéal pour semer une culture de printemps derrière.

Nos conseils

- Semer de début octobre à mi-novembre à 80 kg/ha
- Récolter lorsque la dernière feuille apparaît et AVANT l'épiaison (plantes environ 70 cm).
- Récolter avant fin avril pour préserver la qualité et permettre un semis de printemps ensuite.
- Faucher à 8 cm minimum.

Les renseignements fournis dans ce document ne sont donnés qu'à titre indicatif et peuvent varier en fonction des conditions agronomiques et climatiques, ainsi que des techniques culturales. La résistance aux maladies concerne les maladies ou souches actuellement connues en France.